

- Recueil à effectuer si possible avant **tout traitement antibiotique**.
- Utiliser un sac collecteur enfant (garçon, fille ou mixte) fourni par la pharmacie.
- **Se laver les mains soigneusement avant et après le recueil**.
- **Nettoyer soigneusement le méat urinaire** à l'aide de la lingette antiseptique fournie et laisser sécher la peau.
- Prendre le sac collecteur et retirer la membrane qui protège l'adhésif.
- Appliquer en massant pour garantir une bonne adhérence (partie adhésive fine au contact du périnée).
- Le sac collecteur doit rester au mieux 15 minutes et **au maximum 1 heure.** Au-delà, il est impératif de changer le sac afin d'éviter tout risque de contamination.
- **Dès que l'enfant a uriné** dans le collecteur, enlever doucement l'adhésif et assurer l'étanchéité de la poche en collant l'adhésif face contre face.
- Mettre le collecteur directement dans le flacon stérile fourni par le laboratoire (sans transvaser) et **identifier ce dernier avec le nom, prénom, date de naissance**
- Mettre le flacon et cette fiche renseignée dans le sachet et apporter le tout au laboratoire dans les plus brefs délais (maximum 1 heure, au-delà placer le prélèvement au réfrigérateur pendant 12 h maximum).

Laboratoire du Centre Médical Europe 44 rue d'Amsterdam 75009 Paris	Instruction Patient : Recueil d'urines pour ECBU chez le nourrisson	C2-INS014-Version 03 Version : 3 Applicable le : 01-10-2023



- Recueil à effectuer si possible avant **tout traitement antibiotique**.
- Utiliser un sac collecteur enfant (garçon, fille ou mixte) fourni par la pharmacie.
- **Se laver les mains soigneusement avant et après le** recueil.
- **Nettoyer soigneusement le méat urinaire** à l'aide de la lingette antiseptique fournie et laisser sécher la peau.
- Prendre le sac collecteur et retirer la membrane qui protège l'adhésif.
- Appliquer en massant pour garantir une bonne adhérence (partie adhésive fine au contact du périnée).
- Le sac collecteur doit rester au mieux 15 minutes et **au maximum 1 heure**. Au-delà, il est impératif de changer le sac afin d'éviter tout risque de contamination.
- **Dès que l'enfant a uriné** dans le collecteur, enlever doucement l'adhésif et assurer l'étanchéité de la poche en collant l'adhésif face contre face.
- Mettre le collecteur directement dans le flacon stérile fourni par le laboratoire (sans transvaser) et **identifier ce dernier avec le nom, prénom, date de naissance**
- Mettre le flacon et cette fiche renseignée dans le sachet et apporter le tout au laboratoire dans les plus brefs délais (maximum 1 heure, au-delà placer le prélèvement au réfrigérateur pendant 12 h maximum).

Page 1/2

Renseignements à remplir :

Nom : Prénom :

Date de naissance :

Date de recueil : Heure de recueil :

Traitement antibiotique récent : ○ Oui ○ Non
Si oui, nom de l'antibiotique :
Début de traitement :
Fin de traitement :

Problèmes urinaires : ○ Oui ○ Non

- ○ Brûlures ○ Douleurs
- ○ Envies fréquentes
- ○ Fièvre
- ○ Autres :

Laboratoire du Centre Médical Europe 44 rue d'Amsterdam 75009 Paris	Instruction Patient : Recueil d'urines pour ECBU chez le nourrisson	C2-INS014-Version 03 Version : 3 Applicable le : 01-10-2023

Renseignements à remplir :

Nom : Prénom :

Date de naissance :

Date de recueil : Heure de recueil :

Traitement antibiotique récent : ○ Oui ○ Non
Si oui, nom de l'antibiotique :
Début de traitement :
Fin de traitement :

Problèmes urinaires : ○ Oui ○ Non

- ○ Brûlures ○ Douleurs
- ○ Envies fréquentes
- ○ Fièvre
- ○ Autres :

Page 2/2