



RECUEIL DES URINES POUR UN ECBU (Examen Cyto-Bactériologie des Urines)



Comment faire le recueil ?

De préférence, recueillir les premières urines du matin au réveil ou **s'abstenir d'uriner au moins pendant 3 heures**.
Il est préférable de recueillir les urines avant toute prise d'antibiotique ou au moins 48h après la fin du traitement, sauf en cas de signes cliniques aigus, ou sur prescription de votre médecin.

- Se laver les mains soigneusement à l'eau et au savon. Faire une **toilette intime soignée** avec la lingette antiseptique ou une compresse imbibée d'antiseptique (type Dakin). Pour les femmes : mettre un tampon périodique en cas de recueil pendant les règles.
- **Éliminer le 1er jet** dans les toilettes et **recueillir le 2e jet** dans le flacon stérile fourni par le laboratoire sans toucher la peau. Si possible, remplir au moins la moitié du flacon.
- Bien refermer le flacon. L'identifier avec votre nom, prénom et date de naissance si cela n'a pas été fait par le laboratoire, et le rapporter au laboratoire dans la pochette plastique le plus rapidement possible (**maximum 2h**). Si les urines ne peuvent être rapportées immédiatement, elles peuvent être conservées maximum 12h au réfrigérateur.



A compléter par le patient

Renseignements complémentaires

NOM :

NOM DE NAISSANCE :

PRENOM :

SEXE : F H

DATE DE NAISSANCE : / /

Date et heure du recueil :

Conservation : Température ambiante Réfrigéré

Date et heure arrivée au laboratoire :

Mode de recueil : 2nd jet urinaire Urinocol (Poche) Sonde urinaire à demeure Sondage aller-retour

Étiquette GED labo

Symptômes : Avez-vous les symptômes suivants ? :

- Fièvre
- Douleurs, brûlures ou gênes en urinant
- Envie fréquente d'uriner
- Autre :

Contexte : Etes-vous dans un des cas suivants ? :

- Infections urinaires fréquentes
- Bilan pré-opératoire
- Bilan post-opératoire
- Grossesse en cours
- Suivi urologique
- Diabète ou immunodépression

Renseignements sur le traitement ?

- Traitement antibiotique récent (depuis moins de 48h)
- Traitement antibiotique prévu après le recueil
- Lequel ? :
- Contrôle après traitement